

# Forum du Bucodes Surdifrance

27 septembre 2014

Baromètre  
Santé  
**BSM**  
Sourds et  
Malentendants

[www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr)  
**inpes**  
Institut national  
de prévention et  
d'éducation pour  
la santé

**Vous êtes sourd, malentendant ou  
vous avez des troubles de l'audition :  
participez à la 1<sup>re</sup> enquête sur  
votre santé**

Avec le soutien de la

  
**CNSA**  
Caisse nationale de  
solidarité pour l'autonomie

[www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr)  
**inpes**

# Plan

- Méthode
  - Santé mentale
  - Santé et travail
  - Recours aux soins
- Method
  - Mental health
  - Health and work
  - Care seeking

# Méthode

## Objectif :

Interroger les personnes sourdes, malentendantes et/ou ayant des troubles de l'audition sur les thèmes du Baromètre Santé 2010

- Des perceptions de la santé et des pratiques spécifiques en comparaison avec la population générale ?

## - Goal :

Survey the deaf, hard of hearing and people with other hearing disorders on the themes of the Health Barometer 2010.

- Are there specific perceptions of health and specific practices ?

## Enquête sur Internet

3000 personnes de plus de 15 ans résidant en France métropolitaine et dans les DOM.

## Online study

3000 people (15 years old or older) living in Metropolitan France or in overseas departments.

# Profil des personnes interrogées

- Une surdité survenue avant l'âge de la retraite.
  - 1/3 : avant 2 ans
  - 1/3 : entre 2 et 26 ans
  - 1/3 : après 27 ans
  - 6% de l'échantillon après 60 ans

# Profile of respondents

- A deafness occurred before retirement age.
  - 1/3 : before the age of 2
  - 1/3 : between 2 and 26
  - 1/3 : after 27
  - 6% of the sample after 60

- 1/3 des personnes sourdes locutrices de la LSF
- 1/3 using French sign language
- 1/3 des personnes très gênées par des troubles de l'audition (acouphènes / hyperacousie)
- 1/3 of people highly disturbed by hearing disorders (tinnitus / hyperacusis )

# Santé perçue et santé mentale

## Perceived health and mental health

Données pondérées	BSSM	BAROMETRE SANTE 2010
Santé perçue médiocre ou mauvaise Fair or poor perceived health	22 %	10 %
Détresse psychologique (4 dernières semaines) Psychological distress (last 4 weeks)	46 %	17 %
Pensées suicidaires (12 derniers mois) Suicidal thoughts (last 12 months)	21 %	4 %
Tentatives de suicide au cours de la vie Lifetime suicide attempts	14%	6%

# Les situations les plus à risques de pensées suicidaires

## Highest Risk factors for suicidal thoughts



- Fatigue liée à la communication au quotidien

- Troubles de l'audition très gênants dans la vie quotidienne

- Se sentir limités par un problème de santé ou un handicap

- Avoir subi violences psychologiques ou sexuelles

- Fatigue related to everyday communication

- Very annoying hearing disorders in daily life

- Feeling limited by a health problem or disability

- Having suffered psychological or sexual violence

# Violences subies

(Données pondérées) Weighted data	BSSM (Personnes malentendantes) Hard of hearing		Baromètre santé 2010	
	Hommes Men	Femmes Women	Hommes Men	Femmes Women
Regards ou paroles méprisantes ou humiliantes (12 derniers mois)  Disdainful or humiliating glances or words (12 last months)	23%	30%	14%	16%
Violences sexuelles subies au cours de la vie  Sexual violence suffered during lifetime	13%	30%	4%	12%

## Work and health

- 1/3 de la population active du BSSM en situation de détresse psychologique attribuée au travail
- 1/3 of the workforce is in psychological distress attributed to work
- 10% des actifs ont pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois en raison de leur situation professionnelle. (1% en population générale)
- 10% of the workforce have considered suicide in the last 12 months because of their employment status. (1% in the general population)
- Les tentatives de suicide sont attribuées à 23% à des motifs professionnels (10% en population générale)
- 23% of suicide attempts are attributed to professional reasons (10% in the general population)

# Les situations plus à risque de mal-être dans le travail

## Highest risk factors for mental ill health at work

- Elles entendent avec beaucoup de difficultés
- **They hear with great difficulty**
  
- Elles ont des difficultés à comprendre les collègues
- **They have difficulty understanding colleagues**
  
- Moins de latitude décisionnelle (objectifs contraints)
- **Less decision latitude (forced objectives)**
  
- Manque de ressources
- **Lack of resources**
  
- Bruit gênant au travail
- **Annoying noise at work**

# Recours aux soins

## Care seeking

- Recours plus fréquent au médecin généraliste, aux psys. En lien avec davantage de maladie chronique et des situations de mal-être.
- Increased use of GPs and psychiatrists or psychologists, in connection with more chronic diseases and situations of distress
- Un renoncement plus fréquent aux soins : par ceux touchés par des troubles de l'audition très gênants
- Frequent foregoing of health care: for those affected by very disturbing hearing disorders